



דף הסבר לסייעת רפואית/צוות חינוכי

אטרזיה של הוושט

!!אין להתייחס לכתוב בדף ללא חתימת ההורים!!

כללי: אטרזיה של הוושט (איטמות) הינו מום מולד נדיר, הילדים עוברים בדרך כלל ניתוח לתיקון המום בימים הראשונים לחייהם.

השפעות על הילד: בדרך כלל לילדים אלו ישנם בעיות באכילה ובנשימה, בעיות אלה מתבטאות בחנקים במהלך האכילה/שתיה ובנוסף קושי בנשימה ושיעולים. **חשוב מאוד** לקבל אישור מההורים לכול מאכל חדש או שיש ספק לגביו לפני שנותנים לילד.

מה להקפיד באוכל:

- א. לשתות מים בזמן הארוחה.
- ב. ללעוס טוב.
- ג. חתיכות קטנות.
- ד. לא לדחוף הרבה אוכל לפה.

זיהוי אוכל תקוע: נדרש להסתכל על הילד בזמן האוכל ולחפש סימנים למצוקה. אי נוחות כללית בגוף (תזוזות חריגות) שינוי בקול (הרבה פעמים האוכל לוחץ על קנה הנשימה), שיעול, עניים דומעות, נוכחות חריגה של ריר ואפילו לשאול את הילד הוא יודע הכי טוב (לפעמים הם מסתירים).

מה עושים כשהילד נחנק:

ראשית לעצור את האוכל, לא ליצור אווירה מתוחה ופניקה. לילדי אטרזיה נתקע האוכל בוושט לכן לרוב לא מסכן את חייו.

סימנים לסכנת חיים: קושי בנשימה, הילד מכחיל, חוסר יכולת לבכות או לעשות קולות *מתי להתקשר להורים?

כתבו מה אתם עושים ומה אתם ממליצים לסייעת-

חתימת ההורים